

Sugar Ditter NEW

CONCIME ORGANICO AZOTATO-BORLANDA FLUIDA



Composizione p/p

Azoto (N) totale	1%
di cui (N) organico	1%
Carbonio Organico (C)	10%

Proprietà Chimico Fisiche

Densità relativa a 20 °C	1,03 Kg/L
pH (1%)	7 - 8

Caratteristiche

SUGAR DITTER è un concime fluido di origine vegetale solubile in acqua. La soluzione, ricca di sostanze naturali, proteine nobili ed aminoacidi, favorisce l'attività biologica del terreno, stimolando i processi enzimatici e la moltiplicazione della microfauna e microflora terricola. Grazie a questa caratteristica il prodotto può essere impiegato su tutti i terreni ed in tutte le colture. L'azione più evidente si manifesta nei confronti degli apparati radicali con conseguente maggior capacità di assorbimento degli elementi nutritivi.

Vantaggi e finalità fisiologiche

A	Migliora le proprietà fisiche e biologiche del terreno, incrementandone la fertilità.
B	Stimola l'attività biologica del suolo attivando numerosi processi enzimatici e la moltiplicazione dei microrganismi utili.
C	Miglioramento della capacità di scambio cationico che ostacola e rallenta il dilavamento dello ione nitrico e di alcuni microelementi.
D	Riduce gli stress di natura biotica e abiotica e migliora lo stato nutrizionale della pianta.
E	Impedisce il disseccamento dei lembi fogliari, la filloptosi e la calatura dei fiori.
F	Migliora la germinazione dei semi, lo sviluppo degli apparati radicali e della microflora e microfauna terricola.

Modalità e dosi d'impiego

FERTIRRIGAZIONE		
Colture	Dosi	Momento dell'applicazione
Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno.	20 - 25 kg/ha	2-3 interventi dalla fase di inizio ripresa vegetativa fino accrescimento frutti.
Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc.	30 - 35 kg/ha	2-3 interventi dalla fase di In post trapianto fino accrescimento frutti.
Colture industriali: cereali (grano, mais, orzo, avena, segale etc.) oleaginose (soia, colza, girasole etc.)	30 - 75 kg/ha	2-3 interventi dalla fase di In post trapianto fino accrescimento frutti.
Ornamentali e floricole.	1,5 - 2 kg/1000 m ²	Totalizzare minimo 2-3 interventi durante il ciclo di sviluppo.

FOGLIARE		
Colture	Dosi	Momento dell'applicazione
Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno.	200 - 300 g/hl	3-5 applicazioni durante il ciclo di sviluppo.
Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc.	200 - 300 g/hl	3-5 applicazioni durante il ciclo di sviluppo.
Colture industriali: cereali (grano, mais, orzo, avena, segale etc.) oleaginose (soia, colza, girasole etc.)	200 - 300 g/hl	3-5 applicazioni durante il ciclo di sviluppo.

MISCIBILITÀ

È compatibile con i più comuni agrofarmaci compreso rame e zolfo. In abbinamento con altri formulati, si consiglia di effettuare sempre piccole prove di saggio.

AVVERTENZE

L'odore caratteristico di SUGAR DITTER rende il prodotto appetibile ed attrattivo nei confronti dei ditteri in forma adulta ed allo stadio larvale, quali: mosca della frutta, dell'olivo e domestica. Si consiglia, pertanto, di non somministrare il prodotto nei periodi in cui tale specie di insetti si trovano in fase di riproduzione.

STOCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra 5 e 28 °C.

Agitare



PRIMA DELL'USO

Confezioni



1 Kg



5 Kg

